



## Le traitement de radiothérapie au niveau de la tête

*Lors du scanner de repérage, un masque personnalisé sera réalisé sur votre visage afin de vous aider à maintenir la position durant le traitement.*

### Les effets secondaires

*Les effets secondaires cités peuvent apparaître à partir de la 2<sup>ème</sup> semaine de traitement mais ne sont pas systématiques.*

- Irritation et démangeaisons du cuir chevelu.
- Chute de cheveux observée au niveau du territoire irradié.
- Œdème cérébral pouvant provoquer le retour des symptômes initiaux tels que des maux de tête, déficit moteur, crises comitiales ..

### Précautions à prendre

- × Utiliser un shampoing doux adapté.
  - × N'appliquer aucune lotion capillaire, parfum, crème... sur le cuir chevelu, le front et la nuque.
  - × Eviter l'exposition au soleil de la zone irradiée l'année qui suit le traitement.
  - × Porter une casquette ou un chapeau.
- 
- × Prévenir votre radiothérapeute dès l'apparition des premiers symptômes pour qu'il réajuste votre dosage de corticoïdes.

Dès l'apparition d'un effet secondaire inexpliqué parlez-en au manipulateur ou à votre radiothérapeute.

Appliquer toutes ces recommandations dès la 1<sup>ère</sup> séance de radiothérapie et pendant 3 semaines après la dernière séance.